



ग्रामीण कृषी मौसम सेवा
भारत मौसम विभाग
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ
अकोला



हवामानावर आधारित कृषि सल्ला

दिनांक : 18-03-2025

बुलढाणा(महाराष्ट्र) साठी हवामान पूर्वानुमान - वर जारी :2025-03-18 (पुढील पाच दिवसांसाठी सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत वैध)

हवामान घटक	2025-03-19	2025-03-20	2025-03-21	2025-03-22	2025-03-23
पर्जन्यमान (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कमाल तापमान (अं.से)	37.8	37.5	36.1	36.5	36.9
किमान तापमान (अं.से)	25.3	25.5	25.2	23.9	25.3
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (टक्के)	39	36	32	34	27
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (टक्के)	23	23	20	21	15
वाऱ्याचा वेग(किमी/तास)	11	14	14	11	11
वाऱ्याची दिशा(अंश)	70	320	320	50	50
मेघाच्छादन (ऑक्टा)	2	5	5	6	2
चेतावणी	कोई चेतावणी नहीं	कोई चेतावणी नहीं	कोई चेतावणी नहीं	कोई चेतावणी नहीं	कोई चेतावणी नहीं

भविष्यवाणी सारांशः

भारतीय हवामान खात्याने आज वर्तविलेल्या पाच दिवसीय हवामान अंदाजानुसार बुलढाणा जिल्ह्यात येत्या पाच दिवसांत कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे.

हवामान चेतावणी (पुढील दिवशी 08:30 IST पर्यंत वैध):

येत्या पाच दिवसांसाठी कोणत्याही प्रकारचा इशारा नाही .

हवामान चेतावण्यांचे कृषीवरील संभाव्य प्रभाव आणि संबंधित एग्रोमेट सल्ले:

हवामानाचा कुठल्याही प्रकारचा इशारा नसल्याने शेतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

कृषि सल्ला:

सध्याची हवामान परिस्थिती लक्षात घेऊन कापणी केलेल्या धान्याला २ ते ३ दिवस उन्हात वाळवावे.धान्यातील दाण्यात १०% पेक्षा जास्त ओलावा राहू नये याची साठवणुकीच्या वेळी काळजी घ्यावी.

संक्षिप्त संदेश सल्ला:

परिपक्व झालेल्या हरभरा पिकाची त्वरित कापणी कोरडे हवामान असताना करावी व त्याची सुरक्षित ठिकाणी साठवणूक करावी.

पिक निहाय सल्ला:

पिक	पिक निहाय सल्ला
भुईमूग	उन्हाळी भुईमूगावर पाने पोखरणारी अळी किंवा तुडतुड्यांचा प्रादुर्भाव दिसताच लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% @ ४ मिली/१० ली. पाणी किंवा क्लिनॉल्फॉस २५% @ २८ मिली/१० ली. पाणी याप्रमाणात फवारणी करावी. पिकाला आन्या अवस्थेमध्ये मातीची भर द्यावी जेणेकरून शेंगांची वाढ चांगली होण्यास मदत होईल.
सूर्य फूल	सूर्यफूल पिकामध्ये तुडतुडे/फुलकिडींचा प्रादुर्भाव आढळून आल्यास त्याच्या नियंत्रणासाठी ईमिडाक्लोप्रिड १७.८ % कीटकनाशकाची २.० मिली/ १० ली. पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
गहू	वेळेवर पेरणी केलेल्या गव्हाचे पिक परिपक्व झाले असल्यास त्याची कापणी करून मळणी करावी. मळणी करताना दाणे फुटणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.मळणी केल्यानंतर तयार झालेल्या शेतमालाची सुरक्षित ठिकाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था करावी.

फळे आणि भाजीपाला पिक निहाय सल्ला:

फळे आणि भाजीपाला पिक	फळे आणि भाजीपाला पिक निहाय सल्ला
कागदी लिंबू	लिंबूच्या झाडांवर होणाऱ्या डिक्या रोगाच्या नियंत्रणासाठी लिंबू झाडाच्या बुंध्याला १ मीटरपर्यंत बोर्डी पेस्ट लावावी.
वांगे	वांगीवरील तुडतुडे, मावा व पांढरीमाशी या किडींच्या नियंत्रणासाठी फॉस्फेमीडॉन ४० % एस.एल. १५मिली किंवा फेनप्रोपॅथ्रीन ३० % ई.सी. ५ मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी.
मिरची	मिरची पिकावरील शेंडेमर व फळसड रोगाच्या नियंत्रणाकरिता डायफेनकोनेझॉल २५ ईसी ५ मिली १० लिटर पाण्यात किंवा अॅझोक्झायस्ट्रोबिन २३ ईसी १० मिली प्रति १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी वाऱ्याच्या दिशेने करावी.
पेरू	पेरू बागेतील फळ असलेल्या मोठ्या झाडांना त्यांचे वय,जमिनीचा प्रकार आणि पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन योग्य वेळी अचूक प्रमाणात ओलीत करावे व शिफारसीत खतांच्या मात्रा द्याव्यात.
कांदा	सध्याच्या हवामानामुळे कांद्यावर फुलकिडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. म्हणून तिच्या नियंत्रणासाठी लॅम्बडा सायहॅलोथ्रीन ५% ईसी ६ मिली प्रति १० लिटर पाण्यातून फवारावे. फवारणी करताना चिकट द्रव्याचा (०.१%) वापर करावा.
संत्रा	आंबिया बहारामध्ये नवीन पालवी येण्याच्या वेळेस सीट्रस सिल्ला या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते. या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे फळझाडांवर विषाणूजन्य रोगाचा प्रसार होऊ शकतो. म्हणून सीट्रस सिल्लाच्या व्यवस्थापनासाठी ईमिडाक्लोप्रिड ०.५ मिली प्रति लिटर पाण्यात मिसळून नवीन नवतीवर फवारणी करावी.
टरबूज	परिपक्व झालेली टरबूजाची फळे तोडून घेऊन सावलीत ठेवावी व त्यातली किडग्रस्त ,सडकी फळे वेगळी काढून चांगली फळे बाजारपेठेत नेण्याची व्यवस्था करावी.

पशुधन विषयक निहाय सल्ला:

पशुधन विषयक	पशुधन विषयक निहाय सल्ला
गाय	जनावरांना वाढत्या तापमानाचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांच्या गोठ्याच्या छतावर गवताचे किंवा पालापाचोळ्याचे आच्छादन पसरवावे तसेच छतावर पाणी शिंपडावे जेणेकरून गोठ्यामधील तापमान कमी होण्यास मदत होईल.

कुकुटपालन विषयक निहाय सल्ला:

कुकुटपालन विषयक	कुकुटपालन विषयक निहाय सल्ला
पक्षी	वातावरणातील उष्णतेपासून पक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शेडच्या छताला वरून व भिंतीला बाहेरून चुना किंवा पांढरा रंग लावावा.

हवामान चेतावण्यांचे संभाव्य प्रभाव (सामान्य):

येत्या पाच दिवसांसाठी कोणत्याही प्रकारचा इशारा नाही .

परिणाम आधारित सल्ला (सामान्य):

हवामानाचा कुठल्याही प्रकारचा इशारा नसल्याने शेतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाही.

Farmers are advised to download Unified Mausam and "Meghdoot" android application on mobile for Weather forecast and weather based Agromet Advisories and "Damini" android application for forecast of Thunderstorm and lightening.

Mausam MobileApp link: <https://play.google.com/store/apps/details/>

Meghdoot MobileApp link: https://play.google.com/store/apps/details

Damini MobileApp link : https://play.google.com/store/apps/details